

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百九十七

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣楊世綸

謄錄監生臣王增聞

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十七

明

周王朱橚撰

痔漏門

痔漏

附論

夫五痔之疾或出鼠乳或發寒熱或生瘡或痒痛或下血其證不一治之不早勞傷過度則毒氣浸漬肌肉穿穴瘡口不合時有膿血故成痔漏經曰痔久不差變為漏是也

腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈謂肺與大腸為表裏主為傳道以行糟粕腸風痔疾有五種其證亦異蓋陰陽氣虛而瘕腑踈風邪乘而熱自生氣濕邪熱攻於腸中至使大便澁而燥熱鬱血熱散而流溢衝浸滲腸裏故以先血後便熱在下先便後血熱在上先血後便久而不愈乃作痔素問云因而飽食飭脈橫解房室勞傷為痔風熱不散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結如梅李核甚者變成漏也

方

蛭皮丸

出濟生方

治五腫痔漏

猪左足懸蹄

燒灰存性

蛭皮

一枚燒灰存性

黃牛角腮

燒灰存性貫

衆槐角子

炮

雷丸

雞冠花

槐花

炒

油髮灰

黃芪

去蘆

香白芷

當歸

去蘆酒浸

枳殼

去穰生用

玄參

黃連

去須

防風

去蘆鱉甲

醋炙各半兩

麝香

別研半錢

右為末米糊丸梧桐子大每服七十丸加至一百丸

空心米飲下年高虛熱寒濕痔疾不宜服之

麝香蝟皮丸

治腸風痔漏疼痛不止大便下血時舉

發

雞冠花

炒八兩微存性

牛角鯁

燒存性

管仲

去毛淨

槐花

微炒油

髮灰

香白芷

當歸

枳殼

去穢

玄參

黃連

黃芪

防風

去蘆半兩

鱉甲

一錢灸黃色

麝香

半錢別研

蝟皮

燒存

性用一箇

訶子

去核五錢淨微炒

猪左懸蹄

五十箇燒存性

右入麝香和米為丸梧桐子大每服三十丸至四十

丸空心米飲下忌動風發病之物

內補丸

出聖惠方

治痔漏積年不瘥

黃芪

二分

槐花

微炒一兩

苦參

半兩

白桐葉

三分

龍骨

三分

狸睛

一對

漏蘆

半兩

蛻皮

一兩

篇蓄

半兩

敗醬

半兩

木

香

厚朴

一兩

去麤皮

生薑汁炙令香熟

硫黃

一兩

細研

猪後懸蹄

甲

一兩

煮續斷

半兩

右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服食前粥飲下

二十丸

寸金錠子

出御藥院方

治一切痔漏經久不可忍者

麝香 輕粉 硫黃 雄黃 雌黃 藤黃 砒

霜 粉霜 黃丹 各二錢 別研 黃漆 牡蠣 紅藤根

各一兩

右為末燒陳米飯和勻捏如大棗子核每用一錠子  
絛在肛門內可深二寸許用定新礪毬兒兩箇燒赤  
醋內蘸過綿裹肛門外慰冷即易一箇次日大便取  
下惡物立效

黃耆葛花丸

出宣明論

治腸中久積熱痔漏下血疼痛



黃芪

葛花

生地黃

焙

黃赤子

小豆花

各一兩

大黃

赤芍藥

黃芩

當歸

各三兩

蝟皮

一箇

檳榔

白蒺藜

皂角子仁

炒各半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸至三十丸桑白皮下食前槐子煎湯下亦得

內補散

治痔

人參

黃耆

當歸

各二兩

白芷

桔梗

川芎

厚朴

官桂

防風

甘草

各一兩

右為末木香同上藥為丸內痔外痔皆治一方用第  
勝藥煎湯洗患處

雞峰烏金散

出直指方

治痔漏

穿山甲

刺蝟皮

猪牙皂角

黃牛角心

各碎炒黃

槐子

皂莢刺

枳殼

貫衆

牛角

阿膠

各等

分再 蛻皮

山甲

同炒黑

右為末每一錢五分用胡桃肉研爛併調酒食前服

大腸有熱荊芥泡湯調下漏血不止當歸煎湯調下

代赭石丸

出直指方

治痔變為漏膿血不止

代赭石

煨醋研

磁石

煮米醋數沸  
蘸七次研

牡蠣灰

龍骨

研

蛻皮

煮焦

皂莢刺

赤石脂

川椒

焙

猪後蹄垂甲

燒各存性

木賊

焙

防風

炒

白礬

煨

右等分細末神麴糊丸小豆大每服五十丸食前艾

并生姜湯下漏血處以熟艾橘和血竭塞日三換

二礬丸

一名釣腸丸

治痔漏傍穿數穴膿不止并腸風脫肛

等

洗痔方

黃連

黃芩

荊芥

蛇床子

各二兩

側柏葉

生四兩

槐條

鏡面草

蚶蚞草

各一握

黑豆

半合

甘草對

兩半

葱

連鬚一握

右新汲水熟煎傾盆內熏後通手洗

黃耆丸

一名黃耆枳殼煎丸出本事方

治遠年近日腸風痔漏熏痒結

核成瘡諸藥不效

黃耆

蜜炙

枳殼

去白麩炒

歲靈仁

各二兩

續斷

槐角子

去蘆

比礬

枯

當歸

炒

乾姜

一方作良姜

附子

炮

生地熟地黃

酒浸

連翹

炒半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大米飲下三十丸進三服

枳殼荊芥散 治腸風痔漏并臟毒下血或肛疼痛

荊芥 防風 苾蕒 木通 當歸 皂角刺

甘草 陳皮 茯苓 枳殼

各等分

右為末每服半兩水一盞煎七分和滓空心溫服後

用

淋洗藥

甘松

鳳眼草

蒴藿

用根葉  
並全

華葱

各等  
分

右為末每服用藥一兩水二碗煎至三五沸痛痒時  
澡洗

烏玉丹

一名黑玉丹  
出直指方

治丈夫婦人腸風痔漏着床大腸

頭疼不可忍者服此藥不拘三四次見效初得此疾  
發痒疼痛穀道四周多生梗核此是痔如破是漏只  
下血是腸風皆因酒色滯氣風毒飲食五事過度即

成此疾人多以外醫塗痔病在腸自有蟲若不去根本則不除此藥的有神效

梭櫚

亂頭髮

皂角水淨洗各二兩

雷丸

芝麻

各一兩

苦練

根

二兩半

蝟皮

牛角腮

三兩製洗淨

乳香

麝香

各半兩

猪蹄甲

後脚者四十箇洗淨

右除乳麝外用藏瓶或沙盒盛鹽泥固濟周回用火煨煙盡存性不可以太過便去火入乳麝再研細用酒打糊丸如梧桐子大空心食前胡桃酒下二三十

丸楊氏方名梭櫚丸添不蛀皂角一兩半餘同一方  
加槐角四兩燒灰存性槥藤子一兩二錢五分炒苦  
練根減一半牛角腮四兩猪蹄甲用二十五箇麝用  
二錢芝麻乳麝雷丸苦練根槥藤子不燒外餘藥各  
燒灰不用藏瓶每服五十粒荊芥茶或酒米飲任下  
秦艽蒼朮湯出衛生寶鑑腸風痔漏者總辭也分則異若破  
者謂之痔漏大便不澀必作大痛此由風熱棄食飽  
不通氣逼大腸下而作也受病者燥氣也為病者胃



濕也胃刑大腸則化燥熱之實勝附熱而來是濕熱  
風燥四氣而合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風  
也作大硬燥結者主病兼受火邪也去此四者其西  
方肺主諸氣其體收下亦助病為邪須常破氣藥兼  
之治法全矣以劉湯與之其效如神

秦艽

錢一當歸

三錢酒浸

澤瀉

二錢

蒼朮

七分

防風

半錢

大黃

少許黃蘗

五分酒洗

檳榔

二分

皂角

燒存性

桃仁

去皮

鐵

湯洗

鐵

右將檳榔桃仁皂角仁另為末外咬咀都作一服水  
五盞去滓入檳榔等三味再煎去滓空心服一方青  
皮五分木香三分同煎病大者再服而愈生冷硬物  
冷茶之類及酒食大麵料乾姜之類犯之其藥不效  
如有白膿加白葵花去萼青皮半錢不去白入正藥  
中同煎又用木香三分為細末同檳榔等三味再上  
火同煎依上法服餌古人治此疾多以歲月除之此  
藥一服立愈若病大者再服而愈

槭藤子丸

出御藥院方

治風痺下血痔漏結核疼痛

槭藤子

一箇重七錢  
酥炙和皮用

茴香

炒

皂角刺

燒存性

蛻皮

燒存

性

枯白礬

白附子

炮

枳殼

麩炒去穰

樗皮

焙乾各半兩

乳

香

錢二

右為末醋麵糊丸梧桐子大每服四五十九溫酒食

前服如有痔瘡疼痛醋研五七丸津唾塗患處

木香厚朴湯

出宣明論

治痔漏脫肛腸胃冷脇虛脹不思飲

食

木香 陳皮 桂心 桃仁 厚朴 肉豆蔻

各一兩

赤石脂

各半兩

大附

三兩炮

皂角子

二兩去皮子酥炙黃

右為末每服二錢溫粥飲調下食前

神丹

出危氏方

治腸風痔漏

刺胃皮

一箇製鉄器中炒黑色為度

皂角刺

半兩燒灰存性

硫黃

一礪研

猪牙角

半兩去黑灰塗蜜炙

白礬

枳殼

剉碎炙

黃耆

蜜炙赤

附

子

除去皮各半兩

白雞冠花

一兩

右為細末酒煮糊為丸梧桐子大每服七丸至十丸

空心食前溫酒下不飲酒者米飲下久年漏痔服至  
三四十日肉滿平安諸痔服之即自消外痔用藥十  
丸同硃砂細碾蜜調塗之常服永除根本若服藥覺  
熱加白雞冠子一兩五錢或二兩更加三五丸服之  
臟腑自調勻也

治痔漏翻花瀉血

出經驗良方

狐狸手足

一副陰乾

穿山甲

蝟皮

各三兩

川芎

乳香

黃明膠

白附子

川烏頭

五靈脂

各二兩

右為麝末沙鍋固濟疾乾用炭火煨通赤去火開窩  
研為末入麝香研園蔓酒調下二錢日三服

黑丸子

出危氏方

專治久年痔漏下血

乾薑

百草霜

一兩

木饅餡

二兩

烏梅

敗椶

百葉

油髮

各五錢以上各燒灰存性却入後藥

桂心

三錢

白芷

五錢各不見火

右為末醋糊為丸梧桐子大空心米飲下三十丸

治風痔漏不問有頭無頭定三日安

出本事方

藜蘆

燒灰半兩

皂角針

只用針不用皮条炒二錢

天麻

半兩乾姜半兩

蓮子草

一兩

真麝

半錢

橘子硫黃

一兩

苦瓜萋

一箇大者

明礬

一兩

右將瓜萋開一孔如小錢大入礬并硫黃在內却將原掩合定藤紙糊却丸鏰子盛坐磚上炭火煨令烟盡為度瓶內悶死候冷取去研細同前六味藥末和勻煉蜜丸梧桐子大每服十丸至五十丸空心溫酒下日三服三日效油麵醃藏牛馬肉魚腥生冷行房行遠勞力一切忌之

紫金丸

出王氏博濟方

治痔漏久不瘥肛邊牙血時出膿血

龍腦 麝香 乳香 雄黃 蜜陀僧

并研各砒炒一兩

霜半兩丹沙

阿魏 安息香

各一錢

右先將乳香安息香阿魏熟水浸冷通軟研如膏次將龍腦麝香丹沙蜜陀僧雄黃各研為末砒霜加棗豆粉二錢同研細更用巴豆三粒去皮心膜壓出油亦研細與前藥一處研勻却入前乳香等膏和丸棗豆大每服一丸空心茶清下兼治腸風等疾婦人心



痛血氣當歸酒下一丸心痛水瀉生薑湯下一丸食  
癥麵湯下氣痛溫酒下一丸

韭根湯 治諸痔漏出膿水疼痛不止

韭根

暴乾

蜀椒

去目并閉口炒出汗

蛇床子

續斷

蕪荑仁

野李根

皂莢白皮

松脂

各一兩

白礬

半兩

右細末每度二兩用水三碗煎二碗濾去滓乘熱於  
盆內先熏後洗日三

香殼丸

出宣明論

治濕熱內甚因而飽食腸癖為諸痔久而

成痛漏速治悉愈之

木香

黃蘗

錢各三

枳殼

炒去穰

厚朴

兩各半

黃連

兩一

蛻

皮

燒一箇

當歸

錢四

荊芥穗

錢三

右為末麵糊丸梧桐子大每服二三十丸溫水食前

日三服

八寶散 治腸風痔漏

大附子

一箇去皮臍

南乳香

二錢半

蛻皮

一箇燒灰

皂角針

一兩

燒灰槓藤子

一箇去皮臍

猪牙皂

一兩去皮

白礬

半兩枯

硫黃

二錢

半

右為末醋糊丸小豆大每服七丸溫酒下日進一服  
二日進二服止假令十日進三次忌諸發毒物

乳香丸

出聖濟總錄

治一切痔漏反花瘡等疾

乳香

研半兩

雄黃

研

生乾地黃

瓦上煨醋浸焙乾

黃蠟

各一兩

麝香

研

龍腦

研

丹砂

研

沒藥

研各一錢

右為末鎔蠟丸梧桐子大每服十丸麥門冬熟水下  
留少藥末貼欲貼時先用橘葉葱湯洗之

螺皮丸

出聖濟總錄

治五痔連年不差漸成痔漏

螺皮

炙焦

龍骨

各二兩

黃耆

細剉

當歸

剉焙

枳殼

去穰麩炒

乾薑

炮各一兩半

艾葉

三分附子

炮製去皮臍二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食前黃耆湯

下

黑聖散

出直指方

治腸風臟毒痔漏及諸下血

當歸

川芎

茯苓

地榆

槐花

敗棕

艾

葉

燒存性

百草霜

右等分為末每服二錢食前陳米飲下

愈痔散

出御藥院方

治男子婦人一切腸風痔漏無問新久

皆可服之

南乳香

另研

槐花

微炒

木香

商枳殼

去穰麩炒

鶴虱

草

澄伽

去蒂

白蕪荑

各一兩

右為末如服時先嚼核桃一箇次用熱酒一盞調藥  
二錢空心日進二服忌發風熱動氣等物

楸藤子丸

出宣明論

治腸風瀉血濕熱內甚因為諸痔久而

不治乃變成漏

黃耆 枳實 槐花 荊芥穗 鳳眼草 皂角

三百箇災 榼藤子一箇

右為末麵糊丸梧桐子大每服二三十丸空心酒下  
米飲亦得忌油膩冷猪魚臭血等物

乳香沒藥散出宣明論治五腫腸風痔漏無問久新

宣黃連 白礬各一兩 穀精草五錢 醋石榴一箇用刀子割下蓋

子裏面取子三停一停次將黃連白礬碎都入石榴內用元蓋子合用濕紙一張裹了後用膠泥拍

作餅子裹石榴以炭火燒通赤取出去泥紙次將穀精草銚子內炒焦黃與石榴同研極碎却入

麝香

錢一  
乳香

錢二  
沒藥

碎一錢  
研

右每服一錢熱酒小半盞調下日三服

香墨散

出聖  
惠方

治痔漏下膿血不止

香墨

分三  
枳實

炒一兩  
微黃

黃耆

劉一兩

代赭

兩一

當歸

劉一兩  
微

炒  
麝香

分一  
細研

白芍

分三

右搗羅為散入麝香更研勻每服食前以粥飲調下

一錢

硫黃丸

出聖惠方

治痔漏腫痛膿血不止

香墨

三分

枳實

一兩麩炒微黃

黃耆

一兩剉

代赭

一兩

硫黃

一兩細研

水飛過

白礬

一兩燒灰

附子

一兩炮製去皮臍

皂莢

一兩燒灰

麝香

一兩

細研

蛻皮

一兩燒灰

皂莢

一兩去黑皮塗酥焦黃炙去子

右搗為末入麝香研令勻以醋煮麵糊丸梧桐子大

每服食前溫粥飲下十五丸

治痔漏疼痛腫硬不消用此熏方

出聖惠方

葭蓉子 韭子 雄黃 吳茱萸 猪牙皂角

以上



並生

用

右搗為末黃蠟為丸彈子大用小口瓶子內燒一丸  
熏痔漏上日可兩度用之

槐角丸

出直指方

治五種腸風瀉血糞前有血名外痔糞後

有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面努肉如蠟  
名鼠痔頭上有孔名漏並皆治之此藥治腸風痔內  
小蟲裏急下膿血不止疼痛消腫聚驅濕毒久服永  
除病源

槐角

去梗枝炒一兩

地榆

當歸

酒浸宿焙

防風

去蘆各八兩

黃芩

枳殼

去穰麤炒各半斤

右為末酒糊丸梧桐子大每服三十丸米飲下不拘

時

槐荆丸

出御藥院方

治男子婦人腸風痔漏先臟腑後便血

槐花

微炒

荆芥穗

去土

枳殼

麤炒去穰各一兩

白礬

生

薄荷葉

鬱金

各半兩

右為末水麵糊丸梧桐子大每服六七十丸空心粥

飲下日進二服

淋瀝藥

出御藥院方

治腸風痔漏經久不瘥痔以成漏瘡口

膿汁涓涓不絕及瘡內有蟲痒痛不止並宜淋洗之

如瘡不破者用後方乾上藥塗貼衛生實鹽

歲靈仙

去土

荊芥穗

去土

商枳殼

去穰炒

乳香

各一兩

細辛

二錢半

鳳眼草

二兩

去苗

右為麤末每服用藥三兩水一大升半煎一升濾去滓稍熱淋洗患處如冷再溫熱再洗遍不用如洗罷

用綿或白絹揩乾上藥如瘡破後不須上藥只淋洗

乾上藥

出御藥院方

如瘡不破用前方淋灑訖用此藥塗之

馬牙硝

別研馬勃各半兩

輕粉

三錢半

右為末如瘡痒痛不破者覷瘡大小用藥多少津液調成膏擦於患處日用三五次

六神丸 治痔漏膿血不止

鯪鯉甲

燒灰

皂莢刺

燒灰

雄黃

鶴虱

為末

硫黃

研各等分

右為一處研勻麝香水煮麵糊丸梧桐子大每服十

五丸空心煎湯酒或湯下加至二十丸

蛭皮丸

出千金方

治痔亦治漏

蛭皮

一具

礬石

當歸

連翹

乾姜

附子

炮

續

斷

黃耆

各二兩

槐子

三兩

乾地黄

五兩

右為末蜜丸桐子大每服十五丸日再加四十丸一

方無礬石地黃肘後方用黃連無連翹

葛花黃連丸

出德生堂

治凡受痔漏便血之證者皆富貴人

也蓋因嗜慾恣情酒色無度或食煎燂之肉大腸受

熱毒之深故有斯疾或痔如鼠爛連珠翻花雞冠之  
狀其形不一或在大腸頭上糞門左右腫痛流膿出  
血發作不時面色痿黃飲食減少或有糞後更血紅  
黑又有長系縷之血起卧艱難並宜服之

黃連

一斤酒蒸浸  
去酒晒乾

枳殼

半斤去  
穰炒

乾葛

四兩  
葛花四兩  
如無

以干葛  
代之

槐花

四兩

木香

三兩

右為末留浸黃連酒作麵糊丸如桐子大每服五十  
七十丸飯水下酒亦可不拘時日進三服

奧樗皮散

出聖惠方

治痔漏下血不止及膿

奧樗皮

一兩微炒剉

醋石榴皮

一兩微炒剉

地榆

一兩微炒剉

黃連

一兩去鬚

艾葉

三分微炒

阿膠

一兩搗碎炒令黃色

右搗羅為散每服食前粥飲下二錢

蝟皮丸

出聖惠方

治痔漏膿血不止發歇疼痛

蝟皮

一兩微炒灰

白礬

半兩燒令汁盡

皂莢刺

一兩微炒灰

硫黃

半兩細研

附

子

半兩炮製去皮

楸藤子

一箇去殼

右為末醋煮麵糊丸桐子大每服食前溫粥飲下二

十丸

大草薺丸

出聖惠方

治一切痔漏不論深淺必驗方

黃耆

二兩剉

枳實

一兩五錢麩炒微黃

草薺

三兩剉

白蒺藜

三兩微炒

去刺

兔絲子

一兩酒浸三日曝乾炒搗末

烏蛇

三兩酒浸去皮骨微炒

右搗為末煉蜜和丸桐子大每服空心及晚食前溫

粥飲下十五丸

神驗散

出神效方

治腸風痔漏及五種腸風下血糞前有血

名外痔糞後有血名內痔大腸名脫肛穀道四邊有



弩肉如乳頭名鼠妳痔有穴腸出血名漏並皆治之

牛頭角腮

一隻酌中者

猪牙皂角

七穿山甲

四十九片或圓取或

四方取或一字去

蝟皮

一蛇蛻皮一條

右槌碎盛在小口磁器內鹽泥固定日中晒乾瓶口

微露出烟用文武火燒紅赤烟為少取出放冷為細

末如服藥日先一日臨卧細嚼胡桃仁半箇如糊用

溫醇糯米酒一盞送下不語便睡先引出蟲至次日交

五更服藥驗病年月遠近或秤三錢五七錢用水半

大盞醇糯米半大盞相合令熟煎藥服之至辰時更服一服再依前服藥不須用胡桃仁久病不過七服忌油膩魚鱉雉兔猪犬等物

鶴虱丸 治痔漏膿血不止十年不瘥亦殺蟲

鶴虱炒雷丸

白礬灰各一兩

皂莢刺

硫黃

研等分各

半兩

右研為末醋煮為丸如桐子大雄黃為衣每服二十丸麝香溫酒下空心服之

如聖餅 治痔漏膿血不止臍毒下血

寒食麵

鉛丹

研

白礬

燒令汁盡研

輕粉

研

硫黃

研各等分

右研勻用倒流水和作餅如錢大每服發時以慢火炙黃熟一餅分四服用溫熱水嚼下日日午時夜服

麝香散 治痔漏

麝香

三錢

槐花

半生半炒

荊芥穗

各一錢

千鍼草

去皮根

半兩

礪

砂

三錢

右研為散每服二錢溫酒調下臨卧時服

牽牛丸 治腸風痔漏

黑牽牛

生熟各半

猪牙皂角

去皮

何首烏

香附子

草

烏頭

切破冷水浸秋冬七日夏三日等分亭勻

右為末醋打麵糊為丸如桐子大令患人勿食晚飯次日五更飽食燒熟猪肉一頓少時酒送下五七丸藥行息時用冷水飯頻頻壓之大忌熱物後用熟熱烏頭於瘡上時時換炙之

麝香丸

出聖惠方

治痔漏瘡腫疼痛膿血不止

麝香

半兩  
研細

蝸牛子

二兩  
炒黃

竈突黑

二兩

道人頭

二兩

漢椒

二兩去目及  
閉口者微炒

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食前粥飲下

黃礬丸

出聖  
惠方

治痔漏腫痛膿血不止

黃礬

三兩

烏蛇

六兩酒浸去  
骨皮炙令黃

黃耆

三兩

枳殼

二兩麩  
炒微黃

去穢駝胸前毛

三兩半  
燒灰

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十丸煎黃耆湯

食前下

熊膽散

出御藥院方

治痔漏瘡口不合膿汁清稀腫硬不消

熊膽

一錢

雄黃

輕粉

各半錢

麝香

一字

右件研為細末乾糝藥瘡口上

治遠年近日痔漏不瘥

木香

丁香

黑牛末

白牛末

各一錢

右為末用雉子二箇打開取黃與前藥一處調勻再用雉子殼盛藥在內紙封口同煮熟分作四服空心溫酒下

治痔漏

附子

一箇

腦子

麝香

沒藥

各一錢

右為末取薄荷自然汁丸梧桐子大每服一丸用蛙口涎沫調開點痔一二丸可治五人

枳殼散 治腸風痔漏

枳殼

木鱉子

防風

單薢

各二錢

右為末每用藥半兩水三升煎至三五沸湯三五次效

異功散 治腸風痔漏便血登廁糞前血為外痔糞後血為內痔大腸不收名脫肛有弩肉為鼠竅痔頭有

孔名漏

方見本門  
諸痔漏

治痔漏此因大腸感風熱而生

出本  
事方

生砒

一  
字

木銀

一粒如  
米大

真麝

一粒如  
小豆大

膩粉

一  
字

右件並乳入鉢內研令極細如痔或有珠子者將白礬盪洗淨拭乾用手撚藥搯在痔內上搯得痒時便是藥行一日二次又洗去五日後住藥見效如或有



孔即用紙撚引藥送入令徹其內更用紙貼孔前一  
日兩次使藥自然生合

治腸痔漏

出本  
事方

大黃

當歸

川者

苦參

牙皂

去  
皮

右等分末醋糊丸梧桐子大每服二十丸空心溫酒  
下

當歸湯

一名清涼飲  
出直指方

治痔漏消腫疼

當歸

切  
焙

大黃

煨  
對

赤芍藥

甘草

右為麋末每服二錢七分水一盞煎八分去滓稍熱服微利一行為效一方用乳香一錢硃砂五分訶梨勒皮半兩同研為末以大棗二枚去核加藥末二錢七分棗肉紙裏煨熟分作四服茶清嚙下與前藥相間服亦得

槭藤散

出聖濟總錄

治諸痔漏膿血不絕羸瘦

槭藤

三箇生油塗  
炙熱取肉

續斷

雞冠花

炒

烏賊魚骨

去甲

炙各  
一兩

右為末每服二錢七分空心溫酒調下日晚再服

丹粉散

出聖濟總錄

治痔漏有瘡成竅膿血不止

鉛丹

鹽豉

各一兩

膩粉

半兩

大蒜

一顆去皮切

右先搗蒜令爛後入餘藥搗作薄餅焙乾為細末少許貼之日三五次

痔瘡漏

猪牙皂角

七箇燒灰

胡桃肉

七箇燒灰

樺皮

七塊燒灰

瓜蒌

一箇燒灰

存性

右為細末好酒調服空心分二服喫

痔瘡未破者

乳香

錢一

硼砂

錢一

雄黃

錢一

信

錢一

右為細末用猪膽調塗

硼砂丸

出聖惠方

治痔漏下血不止肌體黃瘦四肢無力

硼砂

兩一

黃丹

兩一

砒霜

半兩

硃砂

兩一

右都細研入瓷盆子內歇口小火燒令烟出為度  
停冷又細研用火燒七遍了入麝香一分同研令細

麵糊和丸梧桐子大每於食前枳殼湯下五丸忌熱物

麝香散

出御藥院方

治下部脫血或瘡痔漏久不差

麝香

血蝟

各半兩

蝟皮

一兩

右先研蝟皮血蝟為末次入麝香拌勻每服半錢溫酒一盞調勻食前日二服

枳殼散

出御藥院方

治腸風痔漏便血無數疼痛不可忍者

枳殼

麤炒去穰

槐子

微炒黃色

荊芥穗

各半兩

右為末每服三錢粟米粥調下如人行一二里地再用粥壓之空心日進三二服

治脫肛痔漏

出神效方

胡荽

一升乳香

少許粟糠

半升或一升

右先泥成爐子留一小眼可抵肛門大小不令透烟

火熏

治痔漏下血不止

出神效方

紫皮蒜

十箇獨科者炒

大椒

六十顆

豆豉

四兩

右搗爛為泥丸彈子大空心細嚼一丸鹽湯下日三服

薰漂藥

出神效方

風眼草

赤皮葱

椒各等分

右同漿水滾過坐盆令熱氣熏痔但通手漂之如法不過三次愈

治痔漏乳痔

出經驗良方

側栢葉

二兩

乳香

二錢

枳殼

去白一兩

右為末二錢空心飯飲調下

洗藥

出經驗良方

治痔漏下血

荊芥

枳殼

各等分

馬鞭草

多使

右焙乾為麤末煎湯熏洗

治腸風痔漏

京三稜

用黑豆炒切作片子

馬兜鈴

穀精草

各等分

右為散水同煎熏洗效

枳殼丸 治腸風痔漏久不差者



先穗子

三兩 皂角

一兩去皮

枳殼

二兩去穰生

右為末煉蜜丸梧桐子大空心五十丸

二聖散 治腸風痔漏不問有吃嗒破不破者治之

枳殼

二兩用麩炒過去穰用

黃耆

二兩破故紙

二兩微炒

右一處為細末空心好酒調下三大錢如不飲米湯

調下忌食燒肉熱麵雞鮓牛馬肉葱蒜韭并動風之

物一月

治腸風痔漏

出本  
事方

赤芍藥

官桂

去皮

甘草

炙各等分

右咬咀每服二錢生薑二片白糖一塊水一盞煎七分去滓空心服之

丹砂塗方

治諸痔漏疽瘡

丹砂

麝香

蛇蛻

燒灰各一錢

右研令細以鹽湯洗瘡拭乾後塗傳日三二度

療痔漏疽瘡

光明砂

別研

麝香當門子

別研

蛇皮

五月五日煮炙

右等分研先以鹽湯洗拭乾瘡少蜜以散傳上瘡

治痔瘡

荊芥 木鱉子 朴硝

各等分

右煎湯入於瓶內熏後湯溫洗之立效

治痔漏涓涓出膿血疼痛日夜不止漸加羸瘦宜服

聖出

惠方

磁石

二兩

白礬

二兩

綠礬

四兩

右搗細末入瓦瓶子內盛大火燒令通赤候冷將出

紙襯攤於地上經宿細研如粉煮棗蘘和丸菜豆大  
每服食前粥飲下二十丸

木賊丸

出聖  
惠方

治痔漏痛不可忍者

木賊

一兩

槿藤子仁

二枚塗  
酥炙黃

烏賊魚骨

二兩

右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服不拘時候溫  
粥飲二十丸下

治痔漏久不瘥宜服此方

出聖  
惠方

蛇床子

半兩  
末

荊芥

半兩  
末

蝸牛

三七  
枚

右一處研爛塗在紙上每發時先用白礬熱水洗痔頭了後用被褥上安藥紙上坐兩次瘡

露蜂房散

出聖惠方

治痔漏膿血不止

露蜂房

半兩炙黃

蛻皮

半兩炙令焦黃

麝香

一錢

右細研令勻每日三五度半錢傳之

管仲散

出御藥院方

治腸風痔漏

管仲

紅藤

各四兩上等好者

右為麈尾分作四分服用綿紙包作四裹每服一包

上好酒一升煎至五服用小口器溫服藥滓收著候  
四服藥滓一處用水碗半至五服用小口器盒盛放  
被兒內熏著瘡門就熱通手洗如虫子死後便瘥不  
痛

治痔漏

出儒門  
事親書

白牽牛

頭末  
四兩

沒藥

一兩

右細末如欲服藥先一日不食晚飯明日空心獐猪  
精肉四兩燒令香熱薄批散藥在內裹之漸漸細嚼

食盡然後宿蒸餅壓之眇下膿血為效量病大小虛實加減服之忌油膩濕麵酒色三日外不忌一服見效或用淡水煮肉熟用上法亦可又用服前一日不食午飯并夜飯明日空心用之

淨固丸

出儒門事親書

治痔漏下血痒痛

槐花

炒

枳殼

去穰各一兩

右為末醋糊丸梧桐子大每服二十九丸米飲下空心十服見效

槐荆丸

出儒門  
事親書

治痔漏

槐花 荆芥

右等分為末每服一兩水煎空心下

蒲黃散

出儒門  
寶鑑

治下部痔漏

蒲黃

一兩  
五錢

血竭

右為細末每用少許貼於患處

治痔漏瘡方

出本  
事方

雞子

一枚煮熱去  
黃取白切焙

白礬

明為如皂角子大  
匙上枯訣用三分



右為末用溫湯淨洗拭乾用紙撚占藥入瘡孔內立  
效一日二易

治男子婦人諸般痔漏

出本  
事方

黃牛角

狼毒

各等  
分

右為細末翻花漏每服一錢甘草湯下合官漏薑湯  
下五分腸風米飲一錢酸醋調一錢滴珠漏山梔子  
三箇煎湯下

蜀椒槁藤丸

治痔漏不限年月深淺重痛穿血膿血

不止

蜀椒

去目并閉口炒出汗  
木杵輕搗取紅四兩

槿藤子

大者一箇  
劈破炙

右為末棗肉丸梧桐子大每服十五丸至二十丸空

心溫酒下

麝香散

出聖  
惠方

治諸漏痔有頭因穿破後成漏膿水經年

不乾

麝香

研半  
兩

鵲糞

一  
升

右將鵲糞於淨地上火煨烟盡候冷與麝同研為散

每服二錢七分空心米飲下晚再服一方銷黑錫二

兩和捏作餅子當於瘡上貼之神效

鯪鯉甲散

出聖濟總錄

治諸痔漏有瘡膿出楚痛

鯪鯉甲

炙焦五兩

麝香

研一分

右為散每服二錢空心煎黃耆湯下日晚再服一方

飯湯下

熏漏瘡

蒼耳

枳殼

各等分

右件藥搗麝末水一碗裝磁瓶內煮汁濃坐在上熏

妙

治痔漏下膿血不止

出聖惠方

木賊

一兩炙  
兩蝟皮  
塗焦黃

右搗為散每於食前粥飲下一錢

又方

出聖惠方

遠志

一兩  
兩椶櫚  
燒灰

右搗為散每於食前粥飲下一錢

治痔漏膿血有瘡竅疼痛宜服此方

出聖惠方

砒霜

半粉

研黃蠟

半

右銚子先鎔蠟作汁後下砒霜攪和勻看瘡大小撚為條子下部每發時用絲裹內瘡竅子中良久却取或未有竅子即內大孔中良久取出日三兩度用即效

砒黃傳方治下部漏瘡

砒黃

研 虻蟲

陰乾為末  
各各半兩

右研令勻傳瘡口中以帛裹定日二次

治痔漏

出神效方

用黑白牽牛一合炒黃為末猪肉四兩切碎炒熟與末藥

攪勻作一服用新白米飲二三匙壓之取下白蟲為效

又坐藥

出聖效方

用鯉魚鮫二三甲以薄絲罽裹如棗核樣內之痛即止

治痔漏青葱散

出危氏方

右用葱青內刮涎對停入蜜調勻先木鱉子煎湯熏

洗然後傳藥其冷如水唐仲舉云嘗有一吏人苦此

渠族弟親合與之早飯前傳午後以榜子來謝拜於  
廷下云疾已安矣

又方

出經驗良方

右用死鯿頭燒灰研末塗腸頭上便能縮入

又方

出危氏方

治痔瘡肛門周匝有孔十數諸藥不效

右用狗肉蘸藍汁空心食如不食狗肉驪肉蘸汁亦

可七日自安

治痔漏有蟲

出肘後方

右用萆薢細剉貫衆去土等分為末湯酒下二錢食  
前溫服

一方治有蟲下血

右用大棗肉一箇去皮用水銀少許以唾研開和棗  
肉令蒸熱納下部

治腸風痔漏

右用訶子不拘多少和皮於灰火內炮黃色為末先  
用槐枝煎湯洗瘡將藥末貼次日再用鳳眼草煎湯



洗貼藥次用地蓬毛貼令病人自用津唾調搽如瘡  
有青水出速治如膿出難醫仍用紙撚入瘡內用藥  
仍服勻腸丸

治痔漏

右用取向東生芭蕉根搗爛炒熟鋪於軟凳上候令  
坐又易不過三上其疾立除莫犯鉄器一方取汁熱  
酒浸空心服

又方

右用衮麻不拘多少將甌兒盛水於火上煎百沸將衮麻於甌內水中蘸過如法熱將衮麻於瘡上如法緊坐衮麻熱最好如此數次即愈瘡破者好治

治痔漏

右用茄花為末香油調傳或燒灰亦好用

又方

用肥皂去子劈開安蜜於內火炙內令蜜乾如此三次研為末空心酒四十日愈痔除漏孔自滿

痔漏方 初覺糞門腫痛者

右以舊綉刀磨水洗之

又方

右用槿花半開者一把手採煎湯熏之

治五般惡痔漏瘡

右用黑虎膏丸如棗核樣隨大小入穴再用膏藥貼  
上仍用甘草漏蘆煎湯下

治腸風痔漏

出本  
事方

右用鯽魚一尾破開盡去腸入白礬令滿瓦上燒過  
並為細末用雞毛捲藥傳治立效一方敗棕皮包紙  
裏煨香熟去紙熨斗內燒帶生存性為末每服一錢  
空心米飲下一方瓦上燒為灰軟飯丸桐子大每服  
二十丸粥飲下

河水方

出本  
事方

治痔漏下血不止反收痔

右用城市河中水一桶脫衣坐水中頻洗血即止痔亦  
可不過三五次立效

治腸風痔漏

出本  
事方

右用雞冠花不拘多少濃煎湯洗每服一盞空心下井水亦得久患者皆瘥并與數人用皆然神效可驚不類他藥

治諸瘡中毒痔漏等骨蒸彌良

右用羊屎熏瘡

治瘡疥痔下血者

右用水蘇煮汁服之

治癰疽痔漏瘡及小兒丹方

右用水煮棘根汁洗之

治痔漏瘡

右用馬兜鈴於瓶中燒熏病處入藥灸用

啄酒散

出聖惠方

治痔漏有頭出膿水不止

右用啄木鳥一隻燒灰酒下二錢七分膽治瘡蟲立死

治五痔漏瘡殺蟲方

出肘後方

用鰻鱺魚一頭治如食法切作片炙著椒鹽醬調和食之

治大腸痔漏并脫肛

出肘後方

右用虎脰骨兩節蜜二兩炙令黑搗末蒸餅丸如桐子大每服清晨溫酒下二十丸隔夜先和大服後方服此藥

狸骨痔及漏

右用狸骨炙和麝香雄黃為丸服之糞燒灰治鬼瘡

如聖膏 治痔漏有頭或如鼠乳

右用芫花根不計多少洗淨陰乾木臼內搗水少許  
絞取汁於銀石器內慢火燒成膏將絲綿就膏內度  
過以綿繫痔頭初時微痛心躁後落以紙撚子膏藥  
於竅內永除根本未落不得使水

潤腸丸李方御傳科治痔丸方朝貴用之屢效蓋其用  
藥簡要有次第製造有法無苦楚而收效甚速凡痔  
出外或審若蓮花復便血疼痛不可坐卧甚者用下



藥早上藥一次午一次晚一次至夜看痔頭出黃水  
恙如泉當夜不可再上藥一二日為好若年高人應  
外腎牽引疼痛可以人用火烘熱手於大小便間熨  
之其痛自安黃水未盡可再傳一日藥仍須勤晚外  
科人早晚有照黃水流至盡是病根已去也

大黃 枳殼 當歸

各等分

右為末蜜丸梧桐子大每服三十丸白湯或蜜湯下  
老弱人宜麻仁丸或三黃丸痔漏傳雙金散

雙金散

黃連

鬱金

各等分

龍骨散

龍骨

煨

白芷

黃丹

寒水石

煨各等分

右為末摻瘡口上小便赤色服導赤散

導赤散

生地黃

木通

甘草

各等分

右為末每服三錢白湯下將好服內補散

方見在前

痔漏有頭疼痛下血不止

出聖惠方

右用桃根煮汁日二三上洗之

災漏法

出千金方

用葶藶子二合豉一升和搗熟作餅子如大錢厚二分許取一枚當瘡孔上作艾炷如小指大災餅上三炷一易餅三九炷隔三日復一災之外臺災療瘰癧古今緣劍云不災頭瘡葶藶氣入腦殺人

又災漏法

出千金方

右用搗生商陸根捻作餅子如錢厚三分安漏上以艾炙餅上乾易之灸三四次一升艾瘡外臺灸瘰癧

又七月七日未出取麻花五月五日取艾等分搗作注用灸瘡上百壯

血蝎散

出楊氏家藏方

治痔漏疼痛不可忍者

血蝎

須真好者

右件為細末用唾津調塗頻用為妙

玉屑散 治腸風痔漏

右用葫蘆殼燒灰出火氣研極細清晨飲湯調下

治腸風痔漏

右用沙糖打却將樣子蘸糖惹荆芥細末空心服之

側金散

出楊氏家藏方

治痔漏竅下血疼痛

乾黃蜀葵花

黃蘗

去麁皮蜜炙

黃丹

飛過

韶粉

以上四味各半

兩

麝香

一錢別研

右件前二味搗羅為末同後三味研勻每用如患處

乾貼之

降真散

出楊氏家藏方

治痔漏有竅子者

銅錄

別研

白礬

別研

蜜陀僧

別研

降真香

楮葉

各等分

右件為細末每用少許以紙絰蘸藥熬入痔漏竅中

三黃散

出楊氏家藏方

治痔瘡

黃丹

二兩火飛

黃蘗皮

去蘆皮

黃連

去鬚二味各四兩

白礬

一兩枯

右件為細末津唾調下

交藤丸

出楊氏家藏方

血竭

半兩別研

馬蘭根

一斤

烏頭

炮去皮研

人參

去蘆頭

黃丹

二何首烏四兩甘草二兩

右件為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯或酒送下空心食前後服藥了用茵陳湯洗

之如瘡乾無膿血後用三黃散貼

黑神散

出楊氏家藏方

治痔瘡

硫黃 蜜陀僧

碎

右件同炒令烟絕細研為末用少許摻之日兩次用

二香散

出楊氏家藏方

治遠年冷漏

香鼠

一枚令  
災焦

麝香

少許  
同研

右為細末和勻每用少許乾摻瘡口先以溫湯洗之  
過拭乾次用上件藥摻如瘡口深膿出藥下能入血  
者用紙撚蘸藥紙在瘡內自然膿出少從裏生肉面  
外有脚底被簽破及百日瘡不合口貼此藥遂瘥

鯽魚散

出楊氏  
家藏方

治痔瘡

鯽魚

七枚長  
二寸者

首着

三錢  
七分

右件將鯽魚取去腸肚淨洗了用首着子均入在七



枚魚肚內以線繫了文武火上慢慢炙令通裏黃并  
骨焦研細每服一錢溫酒調下空心

千金散

出楊氏  
家藏方

右用鼠狼一枚自死者不拘大小置砂瓶內箬葉包  
定瓶口次用鹽泥固濟用硬炭一十斤簇瓶火煨通  
紅七分盡取出藥瓶在地上出火毒一宿研為細末  
每服二錢入麝香少許熱酒調下食空服如藥十日  
之後用刺蝟皮一枚燒作灰細末入麝香少許每服

金匱要略卷之九十七  
一錢溫酒調下食前千金散服

立驗膏

出楊氏家藏方

治痔漏止發忽腸頭不止血者貼之永

除其根

右方用活黃鱔魚一條利刀斷其首瀝熱血於掌

中急以大活蜘蛛一枚以手指只就掌中研蜘蛛

爛為度去蜘蛛皮刮於磁瓦器內收於發時塗傳不

過三二次瘥

狐骨散

出楊氏家藏方

治痔漏

狐骨 皂角不蛀者

右件各等分咬咀每服一兩如香燒熏

二白散

出余居士  
選奇方

治痔漏膿汁逗流疼不止

寒水石

火燒赤  
放令冷

白滑石

細研

右件各等分同研勻用新綿搥藥撲瘡頭頻用

抵聖湯

出家藏  
經驗方

治痔漏方

右用躑躅花十文俗號蜘蛛花煎湯候一兩滾熱入

朴硝十文在滾的脚桶內其上用板一片蓋令密當

中穿一穴坐在熏之旋將五文荊芥細研入臘茶二錢點飲盡之候湯冷即起昔曾有夫婦俱病因得此方知其效也

玉粉散 治痔漏

右用牡蠣燒煨入地坑出火氣為末濕即乾摻如乾即以津調傳紹興桂真官用此療友人劉葉效

秦艽白朮丸 治痔疾并痔漏有膿血大便燥硬而作疼痛不可忍者

秦艽

一兩去蘆

當歸

五錢酒製

桃仁

一兩湯浸去皮炙令黃

地榆

三錢

枳

穀

半兩麩炒

皂角仁

一兩燒存性去皮

澤瀉

半兩

白朮

半兩

右同為細末和桃仁泥子研勻煎熟湯白麵糊為丸如雞豆仁大令藥光滑焙乾每服二丸白湯送下空心宿食消盡服之待少時以美膳壓忌生冷硬物冷水菜之類并濕麵酒及五辣辛熱大料等諸物犯之則藥無驗矣數服而愈○痔漏之病乃風熱燥濕也以秦艽當歸尾辛溫和血涼燥疎風止痛桃仁潤血

以皂角仁除風燥以地榆破血為下使以枳殼之苦  
寒補腎以下泄胃濕以澤瀉之淡滲使風歸於前陰  
以補清燥受冒之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣  
不足其甘未泄火而益元氣也故曰乾寒瀉火乃假  
枳殼之寒也故人為藥為下焦瀆又曰在下者引而  
竭之多為大便必澀以大黃雄去之其津血亦不足  
以當歸和血及油潤之劑則大便自然軟利也宜作  
劉湯以與之是下焦有病急治之法也以地榆惡人

而槐角故宿食消盡空心作丸服之

秦朮防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛  
非痔漏也此藥治之

秦朮 防風 當歸身

白朮

以上各一錢五分

黃蘗五分

橘皮三錢 甘草六分

紅花少許

桃仁三十箇

大黃煨三分

升

麻

二分 柴胡二分

澤瀉六分

右件剉如麻豆大都作一服水三大盞煎至一盞去  
滓燒熱空心服之避風寒忌房事勿食酒麵辛熱物

及當風寒處大便

當歸郁李仁湯 治痔漏大便硬努肉大便下垂多血

苦痛不能忍

皂角仁

前另為細末煎成調服

郁李仁

一錢麻子仁

一錢五分秦艽

一錢五分

蒼朮

半錢

當歸尾

五分澤瀉

三分大黃

煨三分

生地黃

五分

枳實

七分

右件㕮咀水三大盞煎至一盞去滓空心宿食消盡服之忌風寒處大小便



秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂乞疼不任其痒

升麻

五分

柴胡

五分

黃耆

錢一

炙甘草

五分

防風

七分

藁本

三分

三

細辛

少許

紅花

少許

羌活

錢一

秦艽

錢一

麻

半

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞空心

服之忌禁如前

秦艽當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛

秦艽

錢一

當歸尾

五分

桃仁

二十箇

紅花

少許

枳實

錢一

大黃

煨四錢

澤瀉

五分

白朮

五分

皂角仁

五分

右件劉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去滓  
稍熱服食前

小烏玉丹 治痔漏瘡

乳香

五錢研

麝香

二錢研

芝麻

一兩生用

苦楝根

一兩去皮生用

槐角子

一兩五錢生用

雷丸

一兩生用剉碎

亂油頭髮

三兩剪碎燒存性

黃牛角腮

三兩生用

生豬前甲

四十九箇燒灰存性

南星

一兩生用

穿山甲

四兩鹽固濟煨存性

白礬

一兩飛過

半夏

一兩生用

枳殼

一兩燒

右件各依法過度為細末用好酒醋糊為丸如梧桐

子大每服二十丸空心用米飲吞下日進二服如象  
豆大亦得可服三十丸雞鵝肉新薑豆腐淹藏毒物  
枳殼散 熏洗痔漏

枳殼

二兩

貫衆

二兩

荆芥

一兩

大白皮

一兩

黃連

五錢

蛇床子

五錢 蒼耳根

一把

乾薑

五錢

栢枝

一把

薤頭

一把

黑豆

升無

名異

五錢

青葉

一把

地骨皮

五錢

右件為麤末

每服

一大合

用水三大碗

煎至一

碗先

熏後溫洗日二三次

五倍散 敷貼痔漏瘡

海螵蛸

二錢五分

五倍子

三錢瓦焙乾

乳香

一錢五分

蕪荑

五錢

粉

一錢炒黑色

白鱗頭

一對燒存性

龍骨

一分麝香

半

右為細末先用煎藥洗候乾如破有水乾摻如無水

用津唾調塗瘡

烏蛇丸

治腸風五種痔漏

方見本門諸痔類

貫衆散

治痔漏

貫衆

三箇大者一箇搗碎

草薢

二兩

白芷

二兩好者

右搗羅為細末每服二錢用胡桃酒調下陳米飲亦得空心午前服十年患者服之立效

五聖丸 治腸風痔漏子母痔內痔返花痔

肥皂角

三挺慢火燒存性一分去子

青橘皮

五錢去穢炒

白礬

五錢枯

乾薄荷

五錢

乳香

一分

雷丸

右一處搗羅為末麵糊為丸如茱豆大每服五七十丸用薄荷茶送下日進三服忌毒物

平肌散 治痔瘡久不合者

黃狗骨頭

燒灰

亂髮

燒灰

穿山甲

燒灰

以上三味各等分

右件同研令勻如瘡已乾自用津唾調塗如濕即乾

傳日三四次

兆亭散 治腸風痔漏積年膿不乾

白礬

別研

乳香

別研

黃連

去鬚以上三味各一兩取末

右件用大鯽魚一枚去腸并鱗入藥末在內濕紙裏麻皮纏鹽泥固濟文武火煨熟去泥紙却用慢火炙焦同為細末每服二錢空心粟米飲調下

皂角子散 治腸風痔漏下血經久不瘥者

皂角

一百枚燒  
留性研末

槅藤子

一枚全者去  
殼研不可搗

右件為細末每服二錢七分熱酒下如人行一二十  
五里再飲熱酒一盞投之

天聖年間知濠州馬忠肅家有媼病漏瘡已十年一日  
老兵掃廷下且言前數日過市有醫自遠來諸漏瘡  
可治頃刻之力媼曰吾更醫多矣不信也其黨有以  
白忠肅公者即為召醫視之可治無難需活鱗竹針

五六與之醫乃擲鱗因屈槃以竹針貫之覆瘡良久  
取視有白蟲數十針著鱗醫即令置杯中蠕動如  
線復覆之又得十餘如是五五醫者曰蟲固盡矣然  
其餘皆小虫竟請以常用藥傳之時家有栴柳黃連  
散傳之明日以乾艾湯投白礬二三錢洗瘡然後傳  
藥蓋老人血氣冷必假艾葉以作陽而艾性亦能殺  
虫也如是者再即生肌不一月即愈既而如其言醫  
曰瘡一月不治即有蟲蟲能蠕動氣血亦隨之病漏



不可遂合合則結痛實蟲所為也醫無名於世而治疾有效亦良醫也醫說

抵金膏 治諸般痔漏久不愈者

花藥石

火煨過醋滓研碎

生硫黃

細研黃丹

牡蠣

火煨過研如粉

蚌粉

細研以上五味各二兩

自然銅

一兩火煨醋滓研碎

已上六味同研勻用清油三十二兩入銅鍋內用炭火熬去油十兩次入後藥

草烏頭

四兩連皮尖生用

骨碎補

去毛

漢防已

龍骨 烏

藥 虎骨

如無用敗皂  
五味各二兩

已上六味並為細末入前油鍋內熬成稠膏次入後

藥

乳香 沒藥 血竭 白膠香 安息香

已上五  
味各二

兩並為  
細末

右件同入前鍋內急一校子攪勻少時取出以合子  
盛之不得蓋收三日後火力定每服一小匙溫酒下  
不計時候

茶藟散 治諸般痔漏下血疼痛

黃牛角腮

二蛇蛻

猪牙皂

剉

刺蝟皮

剉

椶櫚皮

剉牛鼠狼皮

茶藟葉

剪碎已上六味各五錢

穿山甲

七十片

管衆

一兩乳髮

一分

右件拌勻入磁罐內以鹽泥固濟了晒乾用炭火煨通紅為度候冷取出研細末每服二錢先嚼胡桃肉半枚次以溫酒調藥同下臨卧至五更初又服一服至辰時又服一服如此服三日永除根本

烏金散 治一切痔漏瘡

烏金子 枳殼 歲靈仙去土 五倍子 紫河車用煨

者 黃牛角腮已上六味各一兩同為細末 皂角子 猪蹄甲用猪

蹄向後小爪不着地者甲

右件入磁罐子內以瓦蓋定用雄白雞糞及黃土對  
傳入鹽少許和作泥固濟罐子用木炭七斤煨火盡  
為度碾為末每服二錢入鹽少許空心溫酒調下  
地骨皮散 治諸風痔漏下血不止

地骨皮 鳳眼根皮

並用懸崖中好者去土不用

右二味各等分同炒微黃色搗為細末每服三錢空心溫酒調服忌油膩食物

萬靈丸 治五種痔漏丸穀道生瘤似鼠妳時時發動

或出血者名曰酒痔又曰冷痔若生核子者曰腸風痔發時熱大便難下脫肛良久不入名曰及痔大便或出清血名曰血痔此冷熱搏結得之

硫黃

二錢別研

白礬

二錢

猪牙皂角

五錢

附子

一兩炮去皮臍

皂角刺

一兩燒存性

刺蝟皮

一兩燒存性

槭藤子

一枚生廣中丸者色

如肥

皂子

右件為細末煮稀麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒送下如痔已有頭者用硃砂少許同藥一二五丸一處研細塗於頭上旬日自落又用米醋調藥三五丸傳瘡上即愈如瘡在裏面即將米醋和糟拌藥三兩丸燒熏之

萬金丸

治一切痔漏久不瘥者

木賊 何首烏 荊芥穗 防風 去蘆頭 雞冠花 焙

枳殼

去穰 麩炒

五倍子

黃耆

剉 焙

槐花

槐角

已上十味各一

兩同 為末

皂角子

猪蹄甲

用猪蹄向後小爪不着地甲

皂角刺

麝香皮子

槿藤子

百藥煎

刺蝟皮

以上七味各一

兩入磁罐內鹽泥固濟了候乾用炭火煨至青烟出與前藥末同研細次入麝香二錢

右件為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸  
食前米飲下病久者當常服即去根本

艾葉散 熏漏瘡

鶴虱 艾葉 槭藤子 白膠香

右件各等分剉為散瓦瓶內燒烟熏患處

治痔漏

右以海狔魚皮肪中摩瘡

此魚生大海中

治痔漏瘻及蚰蟥

右取鱧魚腸以五味炙貼患處良久蟲出即去之一方炙香綿裹內穀道中一食頃當蟲出魚腸數易之

盡三枚瘡

鱧魚即  
蝨魚



治痔瘻

出本草

右用桐皮水煎服之

治痔漏

出本草

單用醋林子搗為末酒調一錢七分服之甚效

治痔瘻

出本草

右以蜣螂搗為丸塞下部引痔蟲出盡永瘥以赤其

糞洗之

治痔瘻并瀉血

出本草

右以瞿麥作湯粥食並得

膽礬散

出楊氏家藏方

治附漏瘡焮腫疼痛侵潰膿水不絕久

不生肌

膽礬

一兩煨白色

龍骨

五錢白色者

黃丹

二兩大飛

蛇蛻

一條全者燒灰

別研麝香

五分別研

右件除蛇蛻麝香末外四味研為細末同蛇蛻麝香

和勻先用葱椒湯洗淨搵乾次用藥少許乾摻瘡口

如瘡口小用紙撚子點藥絀入瘡口內日三次用

治五痔漏瘡

捷牛兒膽

一箇 蝟膽 一箇 膩粉 四錢 麝香 少許

右四味先將蝟膽汁調膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如麻子大送於瘡口後追出惡物是驗瘡口漸合生麵蓋瘡內一遍出惡物效

治痔漏腸風方

右用雲臺子四兩為末用好酒麵糊丸梧桐子大每

服三十丸至五十丸溫酒送下日進一服

治痔漏有頭疼痛下膿血

右用吐出胭脂二枚炙乾搗羅為末貼漏頭上當斷  
膿血貼五七度瘡又方用硫黃末少許內瘡孔中以  
艾熏之瘡

治痔漏瘡蝕惡瘡

右用端午日取蟾酥以硃砂麝香為丸如麻子大內  
孔中

治血漏瘡

出本草

右用雄黃末如大豆許內瘡中又服五錢七分血皆

止

痔漏疼痛不可忍

附論

夫痔漏蓋緣寒濕與夫房室醉飽間得之其作也肛邊  
腫痒甚則疼痛不可忍或蔓生數處或似螺蛳膿血與  
肛汁綿綿而有孔不合故謂之痔漏昔人論燒蟲居胴  
腸間多則為痔方論有用熏法及化蟲之藥者不可不察

方

萬金丸

出聖濟總錄

治腸風疾遠年不瘥疼痛不可忍者

安息香 乳香 丁香 木香 沉香 劉 沒食子

肉豆寇 當歸 麒麟竭 沒藥 蜜陀僧

阿魏

各五錢

巴豆

去皮心膜醋炙

砒霜

入菜豆五錢同研各三分

右件將乳香安息香阿魏麒麟竭沒藥等細剉水少許浸一宿來日細研如膏餘藥搗羅為末如膏同研丸如黃米大每服一丸空心冷茶嚥之

北金丸

出聖濟總錄

治痔疾疼痛不可忍及下血

槿藤子

附子

炮製皮臍

硫黃

研

白礬

燒令汁盡

螺皮

炙黃枳

殼

去穢炒

猪牙皂角

醋炙各五錢

右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服十丸米飲或酒

下不拘時候服

淋瀝散

出聖濟總錄

治痔漏痛不可忍

黃芩

去黑心

木通

剉

梔子仁

甘草

炙

太陰玄精石

扁蓄

朴硝

右搗篩每用七錢七分水三椀煎沸傾盆內先坐熏之內候通手節淋瀝上即止熏時令密覆勿泄藥氣

能消丸

出聖濟總錄

治痔漏疼痛如錐刀刺不可忍

歲靈仙

去苗土四兩一名能消

卷柏

去根防風

去蝟皮

燒灰存性阿

膠

炙炒各五錢

糯米

炒一合

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸加二十丸人

參湯下日三服不拘時

括婁散

出聖濟總錄

治痔漏疼痛行履不得



大括萋

一枚開口

猪牙皂角

白礬

各五錢

鯉魚皮

散

電皮

去穢

刺蝟鍼

各一分

右除括萋外為麤末入在括萋內用鹽泥固濟候乾  
用炭五斤煨令通赤放冷取出搗羅為末每服二錢  
七分研胡桃酒調下

荊蘭湯

治五痔痛不可忍

荊芥穗

貫衆

甘草

蜀椒

去目

澤泄

芍藥

各二

兩

右搗篩每服用三匙水三椀煎沸傾盆內先坐熏之  
復令密勿泄出藥氣即淋瀝

試蟲散 治五痔痛甚

臭椿根 地骨皮

右用精猪肉一大片糝藥三錢七分在肉上就肉坐

一二時起看有蟲即去看無即已

熏洗方

出聖濟  
總錄

治諸痔有頭疼痛不可忍

地松

一斤 蛻皮二  
兩 葱根一  
韭根一  
根

右劉細以水五升盆內盛先坐乘熱熏通手即淋洗

日三次用

荊芥湯

出聖濟總錄

治五痔疼痛連陰濕痒

荊芥穗

與橘

厚朴

去麁皮各五錢

右搗篩每用二兩水五升煎三升避風處淋洗

血蝎散

出危氏方

治痔漏疼痛不可忍

血蝎

牡蠣灰

髮灰

各等分

右細末入麝香少許自以津唾調傳如更痛研杏仁

膏調藥傳之

祛痛散 治痔疾疼痛不可忍及腸風下血

皂角子

下住者一千枚麤二升同炒麤焦黑色去麤

薄荷

乾三兩剉

右為散每服二錢米飲調下空心服

枳殼散

出聖濟總錄

治諸痔有頭疼痛不可忍

枳殼

四兩

訶梨勒皮

二兩

右粗搗篩同炒令熟以綿裹熱熨之冷即再炒

烟熏方

出聖濟總錄

白鱖魚骨

熟艾

各等分

右剉碎和勻用新盆子一箇盛藥在內以火燒藥候烟出盆上熏之烟盡即愈

白礬散

一名礬香膏

治痔漏出膿血不止不可忍者

方見本門壯毒

類

止痛膏

出聖惠方

治腸風痔瘻有頭下膿血疼痛不可忍

苘荍子

一合

牛皮膠

一兩

右先用苘荍子後用膠清調成膏攤紙上貼之有頭

者自消

歲靈仙丸

出聖濟  
總錄

治腸風痔漏肛邊乳鼠疼痛不可忍

者

歲靈仙

淨洗焙  
乾二兩

木香

一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸加至三十丸  
不拘時煎荊芥湯下服藥後忌茶半日恐冷即復痛

男子婦人皆服

治大腸痔瘻脫肛疼痛

出聖濟  
總錄

右用虎脚指二節以蜜二兩炙令搗羅為末米飲丸

如梧桐子大每服空心溫酒下二十丸

北金散

出傳信適用方

治久新痔痛如神

先用獨行虎散洗後用北金散傳貼

右用海螵硝去麁皮不拘多少為細末每用二三錢生麻油成膏以鵝翎拂上日夜用之久瘡自消是藥極好不須服藥獨能見效

治痔瘡疼不可忍宜用治之

出德生堂方

萊豆粉

一斤蝸牛一百五十箇二味一處炒鍋內文武火炒黃去蝸牛攤在地上上火

毒後

沒藥

乳香

輕粉

三錢

萊豆

一兩

加

右與沒藥等一味各三錢同研細末每用少許涼水

敷貼瘡上即住疼痛

治痔疾肛門邊腫脹痒痛不可忍救急熨之

白礬

三分  
碾

右以童子熱小便二盞化白礬以洗痔上二日立效

普濟方卷二百九十七